

Waldschutz – Infomeldung Nr. 06-2025 vom 28.07.2025

Flugzeit auch für Unionsquarantäneschädlinge; Reiseverkehr erhöht Gefahr der Ausbreitung

Unionsquarantäneschädlinge stellen eine zunehmende Gefahr für unsere Wälder und Kulturlandschaften dar. Aufgrund internationaler Handels- und Reisetätigkeiten steigt das Risiko der Einschleppung dieser Schadorganismen. Die aktuell forstlich

relevantesten Arten, ihre Merkmale und die einzuleitenden Maßnahmen werden hier zusammengefasst. Eine aktuelle Übersicht der Befallsgebiete entnehmen Sie der Karte auf Seite 2.

Was sind Unionsquarantäneschädlinge?

Schädlinge mit hoher Schadwirkung, die in der EU nicht oder nur begrenzt vorkommen
Amtliche Bekämpfung & Meldepflicht bei Nachweis, um heimische Ökosysteme zu schützen.

Warum nehmen die Risiken zu?

Reise- & Warenverkehr fördern die Einschleppung z. B. als "blinde Passagiere".
Flugzeit: Juni bis September ist Hochsaison für die Verbreitung.



Abb. 1: Asiatischer Laubholzbock (EPPO)

Asiatischer Laubholzbockkäfer (*Anoplophora glabripennis*)

Befällt vitale Bäume, verursacht langfristige Schäden
Lebenszyklus: 1 bis 3 Jahre
Flugzeit Mai bis Juli
Breites Wirtsspektrum (alle Laubbaumarten)

Asiatischer Laubholzbockkäfer



Abb 2: Larvengänge des ALB © C. Picard (EPPO)




Abb.3: Japankäfer ©A. Knoblauch/EPSPD

Japankäfer (*Popillia japonica*)

Ursprung: Nordchina & Japan
Erstmals 2014 in Italien
Lebensweise: Engerlinge fressen Wurzeln, Käfer Blätter & Früchte >300 Pflanzenarten
Gefahr: Massive Schäden an Rasen, Obst- & Ackerpflanzen, Laubgehölzen (wie z. B. Ahorn, Kastanie, Birke)

Lebenszyklus: 1 bis 2 Jahre | Flugzeit Juni-Sept
Hauptverbreitung: Reiseverkehr, Pflanzenhandel
Weitere Informationen finden Sie hier:


[Info-11-2022 Japankaefer 2022 07 12.pdf](#) und
hier: [Japankäfer - Infodienst - LTZ Augustenberg](#)



⚠ Meldepflicht & Maßnahmen laut EU-Recht (2016/2031)

- Bei Verdacht: Sofortige Meldung an die zuständige Behörde ([Ansprechpartner - pflanzengesundheit.julius-kuehn.de](#))
- Maßnahmen: Einrichtung von Befalls- & Pufferzonen, Tilgung, Verbringungsverbote
- Pflanzverbote für gefährdete Wirte möglich
- Erhebungen zur laufenden Ausbreitungskontrolle

© kartooqm (fotolia) / europakarte.org



Abwesend, Schädling ausgerottet
Abwesend, in Fallen gefangen, nicht
nachgewiesen
Abwesend, durch Erhebungen bestätigt
Abwesend, unzuverlässige Aufzeichnung
Abwesend, kein Auftreten bekannt
Aktiv
Aktiv, Maßnahmen
werden fortgesetzt
Aktiv, wenige
Vorkommen
vorübergehend, handlungsbedürftig, in
Tilgungsphase

Bronzefarbener Birkenprachtkäfer	Asiatischer Eschenprachtkäfer	Citrusbockkäfer
Asiatischer Laubholzbockkäfer	Sibirischer Arvenspinner	Asiatischer Moschusbockkäfer
Kiefernholznematode	Japankäfer	Feuerbakterium